



Agro Salud Animal S.A. DE C.V.
Carretera La Venta - Nextipac No. 5052
Int. 26 Col. Nextipac C.P. 45220
Zapopan, Jalisco
Tel: (33) 3656 4009




www.agrosaludanimal.com

PREMEZCLAS

PORCINO, BOVINO, EQUINO, OVINO, CAPRINO Y AVES

20
Años



AGRO SALUD ANIMAL

Es una empresa fundada en 2007 que está comprometida, desde su inicio, con la obtención y distribución de materias primas para la elaboración de medicamentos del Sector Veterinario; materias primas que cumplen con los estándares de calidad establecidos por las farmacopeas, tanto nacional como extranjeras.

Este compromiso dirige día a día los esfuerzos de quienes conforman a Agro Salud Animal, a través de la mejora continua de sus procesos, en lograr la satisfacción y confianza de sus clientes que buscan resaltar el desempeño de sus productos.

MISIÓN

Ser el mejor aliado para la salud animal, ofreciendo medicamentos de alta calidad e innovación constante para nuestros socios comerciales y productores, por medio de nuestra red de distribución, obteniendo la ganancia económica que el cliente necesita.

VISIÓN

Posicionarnos como un referente de la industria farmacéutica-veterinaria global, contando con una red de servicio, distribución, infraestructura y procesos que garanticen la calidad de nuestros productos. Convirtiéndonos en el mejor aliado de nuestros clientes.

VALORES

Empatía: Creemos en la importancia de comprender y valorar las necesidades de nuestros clientes, colaboradores y socios. Construimos relaciones humanas cercanas, escuchar con atención y actuar con sensibilidad y disposición de servicio, buscando siempre generar confianza y bienestar en cada interacción.

Lealtad: La base de las relaciones sólidas y duraderas dentro y fuera de nuestra empresa. Actuamos con fidelidad a nuestros principios, respaldando a nuestro equipo, clientes y aliados comerciales con integridad, gratitud y compromiso, fortaleciendo así la confianza mutua.

Unidad: Trabajamos como un solo equipo, convencidos de que la colaboración y el apoyo mutuo nos hacen más fuertes. En Agro Salud Animal fomentamos un ambiente de unión, comunicación y trabajo conjunto, donde cada persona aporta su talento para alcanzar objetivos comunes y brindar mejores resultados.

Honestidad: Nos conducimos con transparencia, sinceridad y ética en todas nuestras acciones. La honestidad guía nuestras decisiones y relaciones, permitiéndonos actuar con coherencia y generar confianza con nuestros clientes, proveedores y colaboradores.

Respeto: Reconocemos el valor y la dignidad de cada persona, promoviendo un ambiente basado en la cortesía, la inclusión y la consideración hacia los demás. En Agro Salud Animal respetamos las ideas, opiniones y diferencias, fortaleciendo una cultura de convivencia sana y profesional.

Responsabilidad: Asumimos con seriedad y dedicación cada una de nuestras acciones y compromisos. Somos conscientes del impacto de nuestro trabajo en la salud animal, en nuestros clientes y en la sociedad, por lo que actuamos con disciplina, cumplimiento y profesionalismo.

Compromiso: En Agro Salud Animal damos lo mejor de nosotros en cada proyecto, servicio y relación. Nuestro compromiso se refleja en la pasión por el trabajo bien hecho, la búsqueda constante de mejora y la determinación de contribuir al crecimiento y bienestar del sector agropecuario.

Liderazgo: Lograr la efectividad y eficiencia en las tareas diarias para cumplir los objetivos establecidos, superar las expectativas de nuestros clientes y responder satisfactoriamente a los retos que se presentan.



CONTENIDO

**AGROLINK
AMOXIL FORTE
AMOXIL FORTE 50%
BAXINOL
CARBA-AG
FLORMIX
INHIBAC
INHIBAC PLUS
IVERMEC-ASA MAX**

**MUCOFENNICARBA-AG
PARACET-ASA 20%
PNEUMO-TRY
RESPIDOL
TYAMU-CL
TYAMUCLOR-AT
TYASA-R 11%
TYLKO-BAC 20%
TYLOFLOR**

**NATURALES:

ASA DEFENSE
COXY-N
MAXIMUS GROW
ECTO-FREE**

AGROLINK

PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-002



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Lincomicina.....44 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES:

Administrar 400g (176 ppm de Lincomicina) de AGROLINK por tonelada de alimento durante 7 a 14 días continuos.

CERDOS:

Neumonía micoplásmica: Administrar de 2,5 a 5 kg (110 a 220 ppm de Lincomicina) de AGROLINK por tonelada de alimento durante 3 semanas.

Disentería porcina: Administrar 2,5 kg (110 ppm de Lincomicina) de AGROLINK por tonelada de alimento durante 3 semanas.

INDICACIONES:

En cerdos para el tratamiento de la neumonía micoplásmica, ileitis causada por *Lawsonia intracellularis* y disentería porcina.

En aves para el tratamiento de enteritis necrótica causada por *Clostridium spp* y otros organismos susceptibles a la lincomicina.



AMOXIL FORTE

PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-003



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Amoxicilina.....200 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES: Administrar de 1 a 2 kg (200 a 400 ppm de Amoxicilina) de AMOXIL FORTE por tonelada de

alimento durante 5 a 7 días continuos.

CERDOS: Administrar de 1 a 2 kg (200 a 400 ppm de Amoxicilina) de AMOXIL FORTE por tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

BECERROS LACTANTES: Administrar de 1,5 a 2,5 kg de AMOXIL FORTE por tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

AVES: Administrar de 1 a 2 kg (200 a 400 ppm de Amoxicilina) de AMOXIL FORTE por tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

CERDOS: Administrar de 1 a 2 kg (200 a 400 ppm de Amoxicilina) de AMOXIL FORTE por tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

BOVINOS: BECERROS LACTANTES: Administrar de 1,5 a 2,5 kg (300 a 500 ppm de Amoxicilina) de AMOXIL FORTE por tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

INDICACIONES: Para el tratamiento de infecciones digestivas, respiratorias, genitourinarias, cutáneas, articulares e infecciones septicémicas, causadas por gérmenes susceptibles a la fórmula como son las gram negativas y gram positivas.

Cerdos: El espectro de actividad contra bacterias gram positivas, incluye *Streptococcus spp*, *Staphylococcus spp*, *Clostridium spp*, y bacterias gram negativas, incluyendo *Pasteurella spp*, *Escherichia coli*, *Bacillus anthracis* y *Salmonella spp*.

Aves: Infecciones causadas por bacterias gram positivas, incluye *Streptococcus spp*, *Staphylococcus spp*, *Clostridium spp* y bacterias gram negativas incluyendo *Haemophilus paragallinarum*, *Pasteurella spp*, *Escherichia coli*, *Bacillus anthracis* y *Salmonella spp*.

Bovinos: En enfermedades respiratorias, colibacilosis, salmonelosis, infecciones urinarias, enteritis infecciosas.



AMOXIL FORTE 50%

POLVO SOLUBLE



REGISTRO Q-0624-014

FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Amoxicilina
Trihidratada.....500 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, disuelto en el agua de bebida.

DOSIS:

Dosificar de 10 a 20 mg de Amoxicilina por kg de peso vivo.

AVES: 200 a 400 g de AMOXIL FORTE 50% SOLUBLE por cada 1000 lts de agua de bebida durante 3 a 5 días continuos.

PORCINOS: 400 a 600 g de AMOXIL FORTE 50% SOLUBLE por cada 1000 lts de agua de bebida durante 3 a 5 días continuos.

INDICACIONES:

AMOXIL FORTE 50% SOLUBLE es un producto elaborado a partir de Amoxicilina Trihidratada. El excipiente de AMOXIL FORTE 50% SOLUBLE está diseñado para brindarle al producto una elevada solubilidad, estabilidad y palatabilidad del producto en el agua de bebida. La Amoxicilina produce un efecto bactericida al inhibir la síntesis de la pared celular, penetrando para unirse a una proteína específica de la pared celular. Esta unión interfiere con la producción de peptidoglucanos en la pared celular, dando como resultado la lisis bacteriana por cambios osmóticos. AMOXIL FORTE 50% SOLUBLE está indicado para el tratamiento de las infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Amoxicilina. En aves: enfermedades respiratorias, *Coriza*, *Sinusitis*, *Clostridiasis*, *Artritis*, *Salmonelosis*, *Colibacilosis*, *Estafilococosis*. En cerdos: Enfermedad de Glasser (*Haemophilus parasuis*), Meningitis bacteriana (*Streptococcus suis*), Actinobacilosis, Síndrome MMA, Nefritis, Cistitis y Dermatitis.



BAXINOL

PREMEZCLA



REGISTRO Q-0624-065

FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Halquinol.....300 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES: Terapéutico: Administrar 50 a 100 g de BAXINOL por cada tonelada de alimento durante 7 a 14 días continuos.

PORCINOS: Terapéutico: Administrar 400 g de BAXINOL por cada tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

INDICACIONES:

BAXINOL ejerce actividad antibacteriana en el tracto digestivo. También deprime la actividad peristáltica a un nivel que permite un retardo del pasaje de los alimentos a través del intestino, por lo tanto, incrementa la actividad de la absorción de nutrientes. Indicado para el tratamiento de la diarrea, específicamente debida a *E. coli* y *Salmonella spp.*, pero también en diarreas no específicas causadas por cambios en la dieta, no presenta síntomas de toxicidad.



CARBA-AG

PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-064



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Carbadox.....55 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

Terapéutico:

Administrar 1 kg de CARBA-AG (equivalente a 55ppm de Carbadox) por tonelada de alimento terminado durante 7 a 14 días.

INDICACIONES:

CARBA-AG Actúa inicialmente contra bacterias gram positivas y algunas gram negativas. Inhibe la síntesis de DNA bacteriano y destruye el DNA preexistente.

En cerdos se utiliza para el tratamiento de la disentería porcina, es eficaz contra *Treponema* y *Sarpulina hyodysenteriae*, *Salmonella choleraesuis* y *Bordetella bronchiseptica* y contra clostridios. Se utiliza únicamente como tratamiento terapéutico.



FLORMIX

PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-001



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Florfenicol.....40 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES:

Administrar de 500g a 1 kg (20 a 40 ppm de Florfenicol) de FLORMIX por tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

CERDOS:

Administrar 1 kg (40 ppm de Florfenicol) de FLORMIX por tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

INDICACIONES:

Antibiótico bacteriostático primario sintético de amplio espectro de la familia de los fenicoles, efectivo contra bacterias gram positivas y gram negativas, para el tratamiento de procesos patológicos del aparato respiratorio de las aves, provocados por *E. coli*, *Salmonella gallinarum*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multocida*, etc. En cerdos *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Streptococcus suis*, *Clostridium spp* y *Salmonella spp*.



INHI-BAC PREMEZCLA



REGISTRO Q-0624-006

FÓRMULA:

Cada 100 g. contiene:

Sulfametazina.....100 g.
Trimetoprim.....20 g.
Excipiente c.b.p.....100 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

PORCINOS Y BOVINOS:

Administrar 3 kg por tonelada de alimento (equivalente a 30 mg/kg de peso vivo, de los activos) durante 5 a 7 días.

AVES:

Administrar 600 g por tonelada de alimento (equivalente a 30 mg/kg de peso vivo, de los activos) durante 5 a 7 días.

INDICACIONES:

INHI-BAC está indicada en el tratamiento de infecciones causadas por una gran variedad de bacterias gram negativas y gram positivas como: *Bordetella bronchiseptica*, *Corynebacterium sp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp*, *Klebsiella spp*, *Pasteurella multocida*, *Mannheimia (Pasteurella haemolytica)*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Salmonella spp*, *Proteus spp*, *Pseudomonas* y *Fusobacterium necrophorum*.



INHI-BAC PLUS PREMEZCLA



REGISTRO Q-0624-016

FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contiene:

Sulfametazina.....200 g.
Trimetoprim.....40 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES:

30 mg de sulfametazina por kg de peso vivo. 5mg de Trimetoprim por kg de peso vivo. Administrar 1 a 2kg de INHI-BAC PLUS por cada tonelada de alimento durante 3 a 5 días continuos.

PORCINOS:

20 mg de sulfametazina por kg de peso vivo. 5mg de Trimetoprim por kg de peso vivo. Administrar 1 a 2.5kg de INHI-BAC PLUS por tonelada de alimento durante 3 a 5 días.

INDICACIONES:

Premezcla que incluye la combinación antimicrobiana con buen sinergismo y con mínimos efectos a la aparición de resistencia. La sulfametazina compete con el ácido paraaminobenzoico, necesario para la bacteria en la formación de ácido fólico impidiendo así la producción de nucleoproteínas y aminoácidos.

Puede actuar como bactericida y bacteriostático, dependiendo el tejido, la concentración de la droga y el microorganismo infectante. Está indicado en el tratamiento de las infecciones causadas por una gran variedad de bacterias gram negativas y gram positivas como: *Bordetella bronchiseptica*, *Corynebacterium spp*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp*, *Klebsiella spp*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Salmonella spp*, *Proteus spp*, *Pseudomonas* y *Fusobacterium necrophorum*.



IVERMEC-ASA MAX

PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-066



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contiene:
Ivermectina.....6 g.
Fenbendazol.....30 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

AVES: Administrar 333g de IVERMEC ASA MAX por tonelada de alimento durante 2 a 3 días continuos.

CERDOS: Hasta 40kg de peso vivo, administrar 333g de IVERMEC ASA MAX por tonelada de alimento de 3 a 4 días continuos. Cerdos arriba de 40kg de peso vivo administrar 400g IVERMEC ASA MAX por tonelada de alimento durante 4 a 7 días continuos.

BOVINOS: Administrar 1kg de IVERMEC ASA MAX por cada 3 toneladas de alimento durante 3 a 4 días continuos.

EQUINOS: Administrar 20g de IVERMEC ASA MAX en 2kg de alimento en dosis única.

INDICACIONES:

IVERMEC-ASA MAX es una premezcla para el tratamiento de los parásitos gastrointestinales, pulmonares, externos y larvas de mosca.

Nematodos gastrointestinales: (etapas inmaduras y adultas) *Bunostomum spp.*, *Cooperia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Mecistocirrus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Oestertagia spp.*, *Strongyloides spp.* y *Trichostrongylus spp.*

Nematodos pulmonares: *Dictyocaulus spp.*; en sus estadios adultos, inmaduros e inhibidos.

Larvas de mosca: *Hypoderma spp.*, *H. lineatum* y *Dermatobia hominis*.

Parásitos externos: Coadyuvante en el control de piojos chupadores de sangre, ácaros de la sarna y garrapatas.



MUCOFEN

POLVO SOLUBLE

REGISTRO Q-0624-063



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Bromhexina.....20 g.
Paracetamol
(Acetaminofén).....100 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, disuelto en el agua de bebida.

DOSIS:

AVES: Administrar 500 g de MUCOFÉN por cada 1,000 lts de agua de bebida durante 5 a 7 días continuos.

CERDOS: Administrar 500 g a 1 kg de MUCOFÉN por cada 1,000 lts de agua de bebida durante 5 a 7 días continuos.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de enfermedades respiratorias en las que la limpieza del aparato mucociliar está afectada y el moco producido es muy viscoso. El paracetamol se utiliza en el tratamiento de enfermedades dolorosas y pirexia.



NICARBA-AG

PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-062



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Nicarbazina.....250 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES: Administrar 500 g de NICARBA-AG por tonelada de alimento equivalente a 125 ppm, durante los primeros 28 días de vida.

INDICACIONES:

Se emplea como coccidiostato contra las especies: *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. máxima*, *E. necatrix* y *E. brunetti*. Destruye los coccidios en la segunda etapa de esquizonte y reduce en grado considerable la producción de oocistos. Se absorbe bien por VO y se distribuye en todo el organismo de manera rápida y eficaz.



PARACET-ASA 20%

PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-012



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Paracetamol.....200 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

Mezcle hasta conseguir una distribución homogénea de PARACET-ASA 20% en el alimento a medicar.

DOSIS:

Porcinos: la dosis recomendada de paracetamol por vía oral es de 15 a 30 mg/kg de peso corporal. Administrar 250 a 500 g de PARACET-ASA 20% por tonelada de alimento (equivalente a 50-100 ppm de paracetamol) cada 24 horas durante 3 a 5 días continuos.

INDICACIONES:

PARACET-ASA 20% está indicado como tratamiento sintomático de enfermedades de origen infeccioso y no infeccioso que cursen con dolor y fiebre. Así como en procesos que desencadenen estrés (el transporte, las vacunaciones, el calor ambiental).



PNEUMO-TRY

PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-061



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Sulfametazina.....50 g.
Trimetoprim.....50 g.
Clortetraciclina.....200 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES: Administrar 800 g a 1,7 kg por tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos, equivalente de 160 ppm a 340 ppm de Clortetraciclina, de 40 ppm a 85 ppm de Sulfametazina y de 40 ppm a 85 ppm de Trimetoprim.

CERDOS: Administrar 1,5 a 2,5 kg por tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos, equivalente de 300 ppm a 500 ppm de Clortetraciclina, de 75 ppm a 125 ppm de Sulfametazina y de 75 ppm a 125 ppm de Trimetoprim.

INDICACIONES:

Premezcla que incluye la combinación antimicrobiana con buen sinergismo y con mínimos efectos a la aparición de resistencia. La Sulfametazina compite con el ácido paraaminobenzoico, necesario para la bacteria en la formación del ácido fólico impidiendo así la reproducción de nucleoproteínas y aminoácidos.

Puede actuar como bactericida y bacteriostático dependiendo del tejido, la concentración de la droga y el microorganismo infectante. Está indicada en el tratamiento de las infecciones causadas por una gran variedad de bacterias gram negativas y gram positivas como: *Bordetella bronchiseptica*, *Corynebacterium spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Fusobacterium necrophorum*.



RESPIDOL

POLVO SOLUBLE

REGISTRO Q-0624-060



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contiene:
Clortetraciclina.....200 g.
Bromhexina.....20 g.
Paracetamol (Acetaminofén).....50g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Bolsa 50 y 100 g. Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, disuelto en el agua de bebida o mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES: la dosis recomendada de clortetraciclina es de 20 mg/kg, bromhexina 0.5 mg/kg y paracetamol 10mg/kg. Administrar 500 g a 1kg por 1,000 lts de agua de bebida (equivalente a 100-200 ppm de clortetraciclina, 10-20 ppm de bromhexina y 25-50 ppm de paracetamol) o

500 g a 2 kg por ton. de alimento (100-400 ppm de clortetraciclina, 10-40 ppm de bromhexina y 25-100 ppm de paracetamol) de RESPIDOL durante 5 a 7 días continuos.

Porcinos: la dosis recomendada de clortetraciclina es de 22mg/kg, bromhexina 0.5 mg/kg y paracetamol 15 mg/kg. Administrar 1 a 1.5 kg por 1000 lts de agua de bebida (equivalente a 200-300 ppm de clortetraciclina, 20-30 ppm de bromhexina y 50-75 ppm de paracetamol) o 2 a 2.5 kg por ton. de alimento (equivalente a 400-500 ppm de clortetraciclina, 40-50 ppm de bromhexina y 100-125 ppm de paracetamol) de RESPIDOL durante 5 a 7 días continuos.

Bovinos: la dosis recomendada de clortetraciclina es de 22 mg/kg, bromhexina 0.5 mg/kg y paracetamol 50 mg/kg. Administrar 1 kg por cada 1000 lts de agua de bebida (equivalente a 200 ppm de clortetraciclina, 20 ppm de bromhexina y 50 ppm de paracetamol) o 2 kg por ton. de alimento (equivalente a 400 ppm de clortetraciclina, 40 ppm de bromhexina y 100 ppm de paracetamol) de RESPIDOL durante 5 a 7 días continuos.

INDICACIONES:

Está indicado para enfermedades respiratorias agudas o crónicas que cursen con moco denso, disminuye la tos y el catarro, facilita la ventilación pulmonar, inhibe la aparición del dolor en procesos febriles, tiene eficaz efecto expectorante y ayuda con las reacciones post vacunales en aves.

RESPIDOL actúa contra: *Haemophilus spp.*, *Bordetella Bronchiseptica*, *Pasteurella Multocida*, *Actinobacillus Pleuropneumoniae*, *Mycoplasma Hyopneumoniae* y *Streptococcus Suis*. Es efectivo en padecimientos infecciosos asociados a *Enzootic Rhusiopathiae* y *Leptospira spp.* En aves actúa contra *E. coli*, *Avibacterium Paragallinarum*, *Pasteurella Multocida*, *Mycoplasma Gallisepticum* y *Mycoplasma Sinoviae*, cuadros infecciosos digestivos asociados con *Salmonella Enteritidis* y *Salmonella Typhimurium*.



TYAMU-CL

PREMEZCLA



REGISTRO Q-0624-007

FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contiene:

Tiamulina.....50 g.
Clortetraciclina.....200 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES: Administrar 1 a 2 kg de TYAMU-CL por cada tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

PORCINOS: Administrar 2 a 2.5 kg de TYAMU-CL por cada tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

INDICACIONES:

La Tiamulina es un antibiótico que presenta fuerte acción contra una amplia gama de Micoplasmas. La Clortetraciclina, un antibiótico de amplio espectro con acción bacteriostática. Resultando una potente asociación sinérgica bacteriostática contra los micoplasmas y microorganismos patógenos secundarios en la Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC), de las aves. Para la prevención y tratamiento de infecciones del aparato respiratorio y tracto digestivo producidas por: *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus Pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli*, *Brachispira hyodysenteriae* y *pilosicoli*, *Serpulina hyodysenteriae*, *Lawsonia intracelularis* (ileitis), *Clostridium*, en infecciones que afectan la reproducción como *Leptospira* y síndrome Mastitis Metritis Agalactia (MMA).



TYAMUCLOR-AT

PREMEZCLA



REGISTRO Q-0624-005

FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contiene:

Tiamulina.....100 g.
Clortetraciclina.....300 g.
Ácido Tereftálico.....100 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES: La dosis recomendada de clortetraciclina es de 20 mg/kg y de tiamulina 20 mg/kg. Administrar de 500 g a 1 kg de TYAMUCLOR-AT (equivalente a 150-300 ppm de clortetraciclina y 50-100 ppm de tiamulina) por cada tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

PORCINOS: La dosis recomendada de clortetraciclina es de 20 mg/kg y de tiamulina: 23.1 mg/kg. Administrar 1 a 2 kg de TYAMU-CLOR-AT (equivalente a 300-600 ppm de clortetraciclina y 100-200 ppm de tiamulina) por cada tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

INDICACIONES:

La Tiamulina es un antibiótico que presenta fuerte acción contra una amplia gama de Micoplasmas. La Clortetraciclina, un antibiótico de amplio espectro con acción bacteriostática. Resultando una potente asociación sinérgica bacteriostática contra los micoplasmas y microorganismos patógenos secundarios en la Enfermedad Respiratoria Crónica (ERC) de las aves. Para el tratamiento de infecciones del aparato respiratorio y tracto digestivo producidas por: *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus Pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli*, *Brachispira hyodysenteriae* y *pilosicoli*, *Serpulina hyodysenteriae*, *Lawsonia intracelularis* (ileitis), *Clostridium*, en infecciones que afectan la reproducción como *Leptospira* y síndrome Mastitis Metritis Agalactia (MMA). El ácido Tereftálico potencia la acción de la clortetraciclina, debido a que el tiempo de eliminación se prolonga hasta por 72 horas; se aumenta la vida media del antibiótico, lo que da como resultado la presencia de mayores niveles sanguíneos y hepáticos.



TYASA-R 11% PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-013



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Tiamulina Fumarato.....110 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

PORCINOS: La dosis recomendada de Tiamulina fumarato por vía oral es de 10 mg/kg de peso corporal. Administrar 500g a 2kg de TYASA-R 11% (equivalente a 55-220 ppm de tiamulina fumarato) por tonelada de alimento, cada 24 horas durante 5 días continuos.

AVES: La dosis recomendada de Tiamulina fumarato por vía oral es de 50 mg/kg de peso corporal. Administrar de 1,5 a 3 kg de TYASA-R 11% (equivalente a 165-330 ppm de tiamulina fumarato) por tonelada de alimento, cada 24 horas durante 5 a 14 días continuos.

INDICACIONES:

TYASA-R 11% está indicado para el tratamiento de enfermedades de origen infeccioso del aparato respiratorio y digestivo de los porcinos y de las aves, causadas por: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, así como bacterias de otros géneros como el *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus suis*, *Leptospira spp* y *Brachyspira hyodysenteriae*.



TYLKO-BAC 20% PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-011



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Tilmicosina Fosfato.....200 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

Administrar de 8 a 20 mg/kg de peso vivo de Tilmicosina.

Administrar de 1 a 2 kg de TYLKO-BAC 20% por tonelada de alimento (equivalente de 200 a 400 ppm), durante 7 días continuos.

INDICACIONES:

TYLKO-BAC 20% está indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica* e infecciones del tracto digestivo producidas por *Brachyspira hyodysenteriae*, *Lawsonia intracellularis*, *Brachyspira pilosicoli*.



TYLOFLOR

PREMEZCLA

REGISTRO Q-0624-015



FÓRMULA:

Cada 1,000 g. contienen:
Tilosina Tartrato.....110 g.
Florfenicol.....40 g.
Excipiente c.b.p.....1,000 g.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

AVES: 20 mg de florfenicol por kg de peso vivo, 50-100 mg de tilosina por kg de peso vivo.

Administrar 1 kg por tonelada de alimento durante 5 a 7 días continuos.

CERDOS: 200 ppm de florfenicol mezclado en el alimento, 50 mg de tilosina por kg de peso vivo.

Administrar de 1 a 2 kg por kg de peso vivo durante 5 a 7 días continuos.

INDICACIONES:

Es un antibacteriano de amplio espectro, está indicado para el tratamiento, en aves y cerdos, de enfermedades causadas por *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Mycoplasma spp* y *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Ambos antibióticos inhiben la síntesis de la proteína a nivel ribosomal.



NUEVAS



ASA DEFENSE
Cúrcuma y Pimienta



COXY-N
Canela y Granada



MAXIMUS GROW
Orégano y Clavo



ECTO-FREE
Ajo



ASA DEFENSE

PREMEZCLA DE EXTRACTOS NATURALES



INGREDIENTES:

Mezcla de extractos naturales de cúrcuma, pimienta y como vehículo aceite vegetal.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

POLLOS Y GALLINAS PONEDORAS:

1 kg/ton de alimento.

LECHONES Y CERDAS: 1 kg/ton de alimento.

INDICACIONES:

Premezcla de extractos naturales para consumo animal. Ayuda a mejorar la palatabilidad.

Extracto de Cúrcuma:

El extracto de cúrcuma (y la curcumina como su compuesto activo) se utiliza en la producción de aves y cerdos como un aditivo dietético natural, principalmente como alternativa a los antibióticos promotores de crecimiento, gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.

La suplementación estimula el sistema inmune, mejora la absorción de nutrientes y promueve el crecimiento.

Ayuda a los pollos a superar el estrés térmico o por hacinamiento, manteniendo la salud de los órganos inmunes.

Modula la composición bacteriana y aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, lo que mejora la salud intestinal y reduce la inflamación.

Extracto de Pimienta:

El extracto de pimienta actúa como un potente aditivo fitogénico natural en aves y cerdos, potenciando la digestión, el sistema inmune y actuando como antioxidante y antiparasitario. Su principio activo, la piperina, mejora la absorción de nutrientes, estimula enzimas pancreáticas y reduce el estrés. En pollos, mejora la conversión alimenticia y el rendimiento, mientras que en cerdos (cerdos de engorde) favorece el perfil lipídico en sangre y la salud cardiovascular.



COXY-N

PREMEZCLA DE EXTRACTOS NATURALES



INGREDIENTES:

Mezcla de extractos naturales de canela y granada, y como vehículo aceite vegetal hidrogenado.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento terminado.

DOSIS:

POLLOS Y GALLINAS PONEDORAS:

1 kg/ton de alimento terminado.

CERDOS:

1 kg/ton de alimento terminado.

INDICACIONES:

Premezcla de extractos naturales para consumo animal.

Extracto de Canela:

El extracto de canela y el cinamaldehído actúan como aditivos fitogénicos naturales que mejoran la salud intestinal, el sistema inmunitario y el rendimiento productivo en aves y cerdos. Funcionan como antimicrobianos, antioxidantes y antiparasitarios, reduciendo patógenos como E. coli y Coccidia, a la vez que mejoran la digestibilidad, la conversión alimenticia y reducen el estrés, potenciando la eficiencia productiva.

Extracto de Granada:

El extracto y subproductos de la granada (cáscara, semillas) son aditivos naturales promotores en la alimentación de aves y cerdos, destacando por su alto contenido de antioxidantes, polifenoles y fibra. Mejoran la salud intestinal, estimulan el crecimiento, reducen la peroxidación lipídica y fortalecen la respuesta inmune, ofreciendo una alternativa natural a los antibióticos promotores de crecimiento.



MAXIMUS GROW

PREMEZCLA DE EXTRACTOS NATURALES



INGREDIENTES:

Mezcla de extractos naturales de orégano, clavo, y como vehículo aceite vegetal.

PRESENTACIÓN:

Saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

POLLOS Y GALLINAS PONEDORAS:

1 kg/ton de alimento.

LECHONES Y CERDAS:

1 kg/ton de alimento.

INDICACIONES:

Premezcla de extractos naturales para consumo animal. Ayuda a mejorar la palatabilidad.

Extracto de Orégano:

El extracto y aceite esencial de orégano (*Origanum vulgare*) se han consolidado como una alternativa natural potente a los antibióticos promotores de crecimiento (APC) tanto en la porcicultura como en la avicultura, debido a sus compuestos activos: carvacrol y timol. Estos compuestos poseen propiedades antimicrobianas, antioxidantes y antiinflamatorias que mejoran la salud intestinal y la eficiencia productiva.

Extracto de Clavo:

El extracto de clavo rico en eugenol, se utiliza como aditivo fitogénico natural para mejorar la salud intestinal, actuar como antimicrobiano (especialmente contra *E. coli* y *Salmonella*) y estimular el consumo de alimento en lechones. Sus propiedades antioxidantes y su capacidad para mejorar la digestibilidad ayudan a optimizar el crecimiento y fortalecer el sistema inmune en diversas etapas productivas.



ECTO-FREE

PREMEZCLA DE EXTRACTOS NATURALES



INGREDIENTES:

Extracto natural de ajo y como vehículo aceite vegetal.

PRESENTACIÓN:

Sobre de 50gr. y saco de 1, 5, 10 y 25 kg.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

BOVINOS: 10 g / animal / día.

INDICACIONES:

Premezcla de extracto natural para consumo animal. Ayuda a mejorar la palatabilidad.

El ajo en bovinos se usa como alternativa natural para controlar parásitos (ectoparásitos y endoparásitos), mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune y reducir emisiones de metano.

Antiparasitario: Actúa contra garrapatas, nematodos y otros parásitos internos y externos.

Antimicrobiano: Inhibe bacterias como *E. coli* y *Salmonella*.

Mejora digestiva: Estimula la flora intestinal, actúa como prebiótico y mejora la absorción de nutrientes.

Reducción de metano: Puede disminuir las emisiones de metano al atacar organismos intestinales productores.

Salud reproductiva: Antioxidantes mejoran la calidad del esperma.

